| Localisation | | | Année | Type | Détails | N | n | Méthode | (g/cm³) | (%) | | (mg/kg) | Éléments échangeable (mg/g) | | | | | | | | | | Éléments totaux (mg/g) | | | | | | | | | | | | | | | | | | pH | µS/cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région administrative | Site | Latitude | Longitude | Année | Type | Détails | N (nombre de tourbières) | n (nombre d'échantillons) | Méthode | Densité apparente | Ash | Von Post | P ech | N-$NO_3$ ech | N-$NH_4$ ech | H ech | K ech | Ca ech | Na ech | Mg ech | Al ech | C | P | N | N-$NO_3$ | N-$NH_4$ | H | Ca | K | Mg | Na | S | Cl | Mn | Al | Cu | Fe | Hg | Ni | Pb | Zn | Ti | Cr | Cd | pH | EC corrigée | Référence |
| 1 | Bois-des-Bel | 47°58' | 69°26' | 2003 | B | Au dessus de la nappe phréatique | 1 | 8 | E et T | 0,07 | | | 0,14 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 1,30 | 0,77 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,80 | 70 | Andersen et al., 2006 |
| 1 | Bois-des-Bel | 47°58' | 69°26' | 2003 | B | Au niveau de la nappe phréatique | 1 | 6 | E et T | 0,06 | | | 0,20 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,44 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | | 1,30 | 0,61 | 1,30 | | | | | | | | | | | | | | | 3,73 | 63 | Andersen et al., 2006 |
| 1 | Bois-des-Bel | 47°58' | 69°26' | 2003 | B | Sous la nappe phréatique | 1 | 6 | E et T | 0,11 | | | 0,10 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,45 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | | 1,30 | 0,54 | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | | 3,69 | 66 | Andersen et al., 2006 |
| 1 | Rivière-Ouelle | 47°27' | 69°56' | 1993 | B | | 1 | 1 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 0,80 | 0,83 | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,71 | 0 | Wind-Mulder et al., 1996 |
| 1 | Rivière-Ouelle | 47°27' | 69°56' | 1993 | B | | 1 | 1 | T | | | | | | | | | | | | | 448,00 | | | | | | 1,50 | 0,80 | 0,83 | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,71 | 27 | Rochefort et Quinty, 1994 |
| 1 | Rivière-du-Loup | 47°50' | 69°25' | 2001-2005 | F | Fen jeune | 1 | 7 | T | | | | | | | | | | | | | | 0,58 | 10,11 | | | | 7,58 | 0,79 | 1,01 | 0,24 | | | | | | 1,73 | | | | | | | | | | Cobbaert et al., 2004 |
| 1 | Rivière-du-Loup | 47°50' | 69°25' | 2001-2006 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 7 | T | | | | | | | | | | | | | | 1,18 | 19,92 | | | | 5,15 | 0,57 | 0,78 | 0,29 | | | | | | 2,17 | | | | | | | | | | Cobbaert et al., 2004 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,47 | 17,18 | 0,69 | 0,71 | | | | 0,35 | 14,80 | 0,00 | 0,02 | | 26,43 | 4,73 | 0,80 | 0,09 | | | 0,08 | | | 0,39 | | | | | | | | 6,19 | 163 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,27 | 16,37 | 0,86 | 0,75 | | | | 0,43 | 19,40 | 0,00 | 0,05 | | 26,43 | 3,70 | 1,18 | 0,13 | | | 0,09 | | | 0,93 | | | | | | | | 6,22 | 132 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,13 | 17,27 | 1,48 | 0,70 | | | | 0,46 | 20,80 | 0,01 | 0,02 | | 29,25 | 2,48 | 1,04 | 0,12 | | | 0,15 | | | 0,39 | | | | | | | | 6,37 | 111 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,18 | 16,76 | 2,29 | 0,63 | | | | 0,42 | 22,10 | 0,01 | 0,02 | | 33,82 | 2,51 | 1,15 | 0,12 | | | 0,04 | | | 0,33 | | | | | | | | 5,76 | 137 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,24 | 18,02 | 2,13 | 0,26 | | | | 0,68 | 25,20 | 0,01 | 0,01 | | 38,57 | 3,40 | 0,74 | 0,17 | | | 0,28 | | | 0,69 | | | | | | | | 6,00 | 217 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,07 | 18,32 | 0,71 | 0,17 | | | 0,29 | 0,29 | 19,20 | 0,04 | 0,01 | | 10,72 | 2,12 | 3,21 | 1,20 | | | 0,02 | | | 1,35 | | | | | | | | 5,68 | 194 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,47 | 18,83 | 0,82 | 0,61 | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 6,29 | 470 | Gret, 2008 |
| 1 | Bic St-Fabien | 48°22' | 65°45' | 2008 | F | Fen modérément riche à fen riche | 1 | 1 | E et T | | | | | | | 0,48 | 17,50 | 0,91 | 0,96 | | | | | | 0,03 | 0,08 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 7,29 | 290